Soins d'hiver des arbres

L'hiver est la saison idéale pour observer ses arbres, les soigner et les protéger. Éclatements d'écorces dus aux intempéries, chancres fongiques ou bactéries, champignons lignivores, galeries d'insectes, nécessitent une chirurgie arboricole et des traitements appropriés.

Soins des arbres

Après des accidents climatiques, des attaques d'insectes ou des blessures de tondeuse au collet d'un arbre, des dépérissements de rameaux, de branches et des crevasses sur les troncs apparaissent.
Le repos végétatif se prête à un état des lieux. Observer les arbres et repérer toute anomalie. Possibilité de marquer les parties à soigner d'un signe distinctif avec une peinture arboricole. Opérer par une belle journée, sans gel ni annonce de pluie. S'équiper d'outils bien affûtés et de produits adéquats : coupe-branche, scie, sécateur, grattoir, serpette, gouge, mastic arboricole. Le pralin (mélange de terre fine, bouse de vache, sable, lithotamme) convient également à la cicatrisation des blessures. Aseptiser les lames du matériel de soin avec de l'alcool à 70°, de l'alcool à brûler ou de l'eau javellisée à 2 %. Cureter et gratter les chancres jusqu'au bois sain pour favoriser le développement d'un bourrelet cicatriciel. Couper les rameaux malades ou abîmés. Parer les plaies à la serpette en réalisant des coupes nettes et les protéger. Ramasser et brûler les déchets de taille. Ne jamais stocker ces résidus près d'un arbre car ils constitueraient une source de contamination.

Champignons lignivores

Quand le bois n'est plus protégé par son écorce, il risque une contamination de polypore. Cureter la partie humide jusqu'au bois dur et sain. Appliquer un fongicide de contact (cuivre, mancozèbe) et mastiquer (goudron de pin, résines, huile végétale) ou appliquer directement un baume fongicide (cyproconazole + carbendazime).

Galeries d'insectes du bois

Que faire en cas de détection de sciure au pied d'un arbre ou de trous dans l'écorce ? Plusieurs larves xylophages hivernent dans leur galerie (zeuzère, cossus, longicorne, sésie).

Traitement d'automne/ hiver

A la chute des feuilles et en hiver jusqu'à l'ouverture des bourgeons (hors gel), fongicide à base de cuivre (sulfate ou bouillie bordelaise, hydroxyde, oxychlorure). Recouvrir uniformément les ramifications et le tronc jusqu'au point de ruissellement. Contre les formes hivernantes des acariens et insectes nuisibles, huile blanche de pétrole ou huile végétale de colza, neutres pour l'environnement et non toxiques pour les personnes. Intervenir jusqu'à 10 jours avant le débourrement. Le badigeonnage du tronc au lait de chaux dilué à 20 % permet de déloger les mousses, les lichens et les parasites des troncs d'arbres fruitiers de leurs quartiers d'hiver.

Éviter les confusions !

Ne pas confondre un éclatement de tronc ou un chancre de l'écorce avec le fendillement (châtaignier) ou la desquamation (bouleau, platane, cerisier, érable) qui sont des phénomènes naturels de l'écorce dus à la maturation de l'arbre. Ces manifestations ne nécessitent aucune lutte antiparasitaire.